



انسولین اپیدرا، یک نوع انسولین آنالوگ است، از انواع انسولین انسانی بوده و نام علمی آن، انسولین گلولیزین می باشد. برای کنترل قند، در افراد بالغ دیابتی و کودکان مبتلا به دیابت استفاده می شود. در واقع انسولین اپیدرا، انسولین سریع الاثر می باشد.

15 دقیقه پس از تزریق انسولین، اثر کاهنده قند خون این انسولین، آغاز می گردد و اوج اثر آن 1 ساعت، پس از تزریق می باشد و 2 تا 4 ساعت در بدن باقی می ماند، بنابراین، معمولاً، انسولین اپیدرا، قبل از وعده غذایی تجویز می گردد، اما گاهی ممکن است بنا به صلاحدید پزشک، بلافاصله بعد از وعده غذایی تجویز گردد. از آنجایی که این نوع انسولین خیلی سریع، توسط بدن جذب می گردد، حتماً باید قبل یا بعد از تزریق این نوع انسولین و بنا به صلاحدید پزشک، ماده خوراکی مناسبی جهت پیشگیری از افت قند خون دریافت نمایید.

شایعترین عارضه تزریق این نوع انسولین، افت قند خون می باشد. ممکن است خارش و حساسیت پوستی نیز مشاهده گردد.

در موارد زیر بلافاصله با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت هر گونه حساسیت به انسولین، افت قند خون علی رغم دریافت وعده غذایی در فاصله مناسب با تزریق انسولین، در صورتی که قلم انسولین شما مخدوش یا صدمه دیده است، در صورتی که انسولین کدر شده، ذرات معلق داشته و یا شفاف به نظر نمی رسد.

