



انسولین لانتوس، نوعی انسولین آنالوگ است و نام علمی آن، انسولین گلارژین می باشد و طولانی اثر است. این انسولین، 24 تا 26 ساعت در بدن دوام داشته، شروع اثر آن 1 تا 2 ساعت بعد از تزریق زیرجلدی می باشد، اوج اثر آن 6 ساعت بعد از تزریق زیرجلدی می باشد. توجه داشته باشید که از آنجایی که این انسولین 24 ساعت در بدن باقی می ماند، اغلب اوقات، یکبار در 24 ساعت تزریق می گردد و زمان تزریق آن به وعده غذایی ارتباطی ندارد. ممکن است بر حسب صلاحدید پزشک نوعی انسولین کوتاه اثر نیز در کنار لانتوس برای شما تجویز گردد.

شایعترین عارضه تزریق این نوع انسولین، افت قند خون می باشد. همیشه یک ماده خوراکی شیرین به همراه داشته باشید تا در صورت بروز علائم افت قند خون، دریافت نمایید.

در موارد زیر بلافاصله با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت هر گونه حساسیت به انسولین، افت قند خون علی رغم دریافت وعده غذایی در فاصله مناسب با تزریق انسولین، در صورتی که قلم انسولین شما مخدوش یا صدمه دیده است، در صورتی که انسولین کدر شده، ذرات معلق داشته و یا شفاف به نظر نمی رسد.

