



انسولین لومیر، نوعی انسولین آنالوگ و طولانی اثر است و نام علمی آن، انسولین دتمیر است. این انسولین، 24 ساعت در بدن دوام داشته، اوج اثر آن 3 تا 4 ساعت بعد از تزریق زیرجلدی می باشد. توجه داشته باشید که از آنجایی که این انسولین 24 ساعت در بدن باقی می ماند، اغلب اوقات، یکبار در 24 ساعت تزریق می گردد و زمان تزریق آن به وعده غذایی ارتباطی ندارد. ممکن است بر حسب صلاحدید پزشک نوعی انسولین کوتاه اثر نیز در کنار لومیر برای شما تجویز گردد. این انسولین، در بارداری قابل استفاده می باشد.

شایعترین عارضه تزریق این نوع انسولین، افت قند خون می باشد. همیشه یک ماده خوراکی شیرین به همراه داشته باشید تا در صورت بروز علائم افت قند خون، دریافت نمایید.

در موارد زیر بلافاصله با پزشکتان مشورت نمایید.

در صورت هر گونه حساسیت به انسولین، افت قند خون علی رغم دریافت وعده غذایی در فاصله مناسب با تزریق انسولین، در صورتی که قلم انسولین شما مخدوش یا صدمه دیده است، در صورتی که انسولین کدر شده، ذرات معلق داشته و یا شفاف به نظر نمی رسد.

