




بررسی مثانه:

در این مرحله دو سوند (لوله استریل قابل تعبیه در مجرای ادرار) بسیار باریک که به یک حس گر متصل است، به ترتیب یکی در مجرای ادرار و دیگری در مقعد بیمار قرار داده می‌شود، علاوه بر آن ۳ الکتروود برای ثبت فعالیت عضلات در محل های مورد نظر گذاشته شده و سپس مثانه بیمار با سرم استریل نمکی پر می گردد. در طی این فرایند منحنی چگونگی عملکرد این عضو (مثانه) در طی پر شدن ثبت می گردد .



سپس بیمار ادرار خود را تخلیه می نماید و در طی ادرار کردن مجدد منحنی عملکرد مثانه در فاز تخلیه نیز ثبت می شود. همچنین این تست، میزان ریزش ادرار را در مواقع سرفه و یا عطسه مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین این تست حساسیت مثانه را می سنجد.



این تست بسیار ساده، علاوه بر این که حالت تهاجمی ندارد، دردناک نبوده و در کمال راحتی صورت می گیرد.

جهت چه مشکلاتی، توصیه به انجام تست یورودینامیک می گردد؟



- تکرر ادرار
- فوریت ادرار
- انواع بی اختیاری ها
- مشکلات دفع ادرار
- سوزش ادرار
- شب ادراری
- مثانه بیش فعال
- اختلالات عملکرد دریچه

تست یورودینامیک چند مرحله دارد؟


سه مرحله دارد: مرحله اول: بررسی جریان ادرار، مرحله دوم: بررسی مثانه، مرحله سوم: بررسی و اندازه گیری میزان کفایت دریچه مجرای ادرار

در هر کدام از این مراحل چه کاری انجام می‌شود؟

بررسی جریان ادرار: این مرحله خود به دو قسمت تقسیم می‌شود:

قسمت اول: بیمار مایعات مصرف می کند و بعد از احساس نیاز به تخلیه وارد اتاق انجام تست شده و تخلیه را در دستگاه مخصوص انجام می دهد و ادرار کردن بیمار بصورت منحنی رسم می گردد.

از اختلالات کف لگن، می توان به مشکلات مربوط به سیستم دفع ادرار، دفع مدفوع و مشکلات عملکرد جنسی اشاره نمود که باعث اختلال در روند زندگی طبیعی افراد می گردد.



در این میان **تست یورودینامیک**، یک روش تشخیصی می باشد که برای بررسی ارگان های کف لگن که در ایجاد اختلالات ادراری نقش دارند، به کار می رود.



با این تست، می توان انسداد ادراری ، تنگی مجرا و انواع بی اختیاری های ادراری را به بهترین نحو تشخیص داد که پیامد استفاده از ایـن تست تشخیص صحیح بیماری به وسیله پزشک و در نتیجه درمان موفق آن است.

با این تست ساده و در عین حال باارزش و سرپایی و بدون جراحی لگن و یا سیستم ادراری – تناسلی می‌توان، نوع اختلالات مثانه را دقیقاً تشخیص داده و درمان نمود.



K-B:01-25-00



بیمارستان کسری

تست یورودینامیک چیست



تهیه و تنظیم:

گروه آموزش به بیمار و ارتقا سلامت بیمارستان کسری

www.kasrahospital.ir

عوارض ناشی از تست یورودینامیک چیست ؟

تا ۷۲ ساعت پس از انجام تست سوزش ادرار و افزایش تعداد دفعات ادرار نمودن، طبیعی تلقی می شود. که با مصرف مایعات کافی برطرف می گردد.

گاهها عفونت ادراری، بعد از انجام این تست ایجاد می گردد و جهت پیشگیری، پزشک شما آنتی بیوتیک لازم را برایتان تجویز می نماید.

ممکن است مدت کوتاهی در ادرار خود خون ببینید که به سرعت برطرف خواهد شد.

واحد یورودینامیک بیمارستان فوق تخصصی کسری با استفاده از پزشکان متخصص و پرسنل مجرب در زمینه تشخیص نارسایی کف لگن و اختلالات مربوطه، فعالیت گسترده ای دارد.

جهت تعیین وقت و یا وجود هرگونه سوال و مشکلی با شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۱۱۱۴۴۴ واحد یورودینامیک تماس حاصل فرمایید.



کلینیک یورودینامیک

اندازه گیری کفایت دریچه مجرای ادرار:

با خروج آهسته سوند مجرای ادرار، وضعیت و کفایت عملکرد مثانه هم به صورت نمودار تشخیصی ثبت می گردد.

مدت زمان انجام تست بر حسب شرایط از ۱۰ تا ۹۰ دقیقه است.

شرایط لازم جهت تست یورودینامیک:

جهت انجام این اقدام تشخیصی، آمادگی خاصی نیاز نیست تنها نکات قابل توجه عبارتند از:

عدم وجود عفونت ادراری (یک آزمایش کامل ادرار منفی)

با مثانه پر مراجعه شود.

قطع داروهای درمانی اختلالات ادراری حداقل ۴۸ ساعت قبل از تست

عدم مصرف غذاها نفاخ و سنگین در شب قبل یا صبحانه همان روز



تخلیه کامل مدفوع قبل از انجام تست به ویژه در کسانی که بی اختیاری مدفوع دارند.